



安全・安心をお届けいたします

グリーンプロジェクト情報 第5号

きらきらEyeランド

JA庄内みどり

発行：庄内みどり農業協同組合
協力：酒田農業技術普及課

初期生育確保を最優先！！ 天候・圃場に合わせた水管理の徹底を！

本年は播種後、比較的温暖な天候で経過したため、一部で高温障害の発生が見受けられましたが、苗の生育は平年よりも早まり概ね順調に経過しました。

耕起作業期間中はときどき降雨がありましたが、4月下旬は好天に恵まれたため、乾燥が進んだ圃場では乾土効果の発現が期待されます。

仙台管区气象台の1カ月予報(4月29日発表)では、天気は数日の周期で変わり、平年よりも晴れの日が少ない予報です。移植後は天候に合わせたきめ細かな水管理で、活着を促進し、初期生育確保に努めましょう。

技、其の一 発根・活着を促進させる保温的水管理

田植え後は、保温的水管理(水深4~5cm程度)とし、発根・活着を促進させましょう。(畦畔からの漏水防止対策として、畦畔ポリ等は田植え後に速やかに設置する。)

活着後、分けつを促すために日中は止め水にして水深3cm程度の浅水管理とし、給水は夕方または早朝に行い、昼夜の温度較差をつけましょう。

また、例年田植え後の強風や低温の影響で、初期生育の停滞が見受けられます。強風時は一時的に5~6cmの“中水”にして稲体の保護に努めましょう。

技、其の二 土壌の還元(ワキ)は根の活力を低下させます

田植え後、好天が続くと土壌の還元(ワキ)が急激に進むことが予想されます。

土壌が還元状態になると有害ガスの発生により根の活力低下・伸長抑制、窒素吸収の遅延など初期生育の停滞につながります。特に重粘土地帯等では注意しましょう。

★還元状態のチェック

- ・圃場に入って歩くとブクブクと泡が出て、臭いニオイがする。
- ・活着後の葉色が薄い。

★主な対策

- ・温暖な日を選び、水交換を行いましょ。
- ・ワキの程度に応じて夜間落水や、2~3日程度軽く田干し(ガス抜き)を行いましょ。

・例年、ワキがひどい圃場では、**VSこがね液**(5ℓ/10a)の田植え直後の施用が効果的です。

(灌水深は5cm
処理後7日間は水を動かさない)



技、其の三 除草剤の散布は遅れずに！

除草剤は、代かきからの日数やノビエの発生状況を確認しながら遅れないように散布しましょう。

★散布後7日間は止め水とし、除草効果を高めましょ。

★散布する前は、畦畔の補修、畦畔ポリ等で漏水対策を実施し、水交換をしてから行いましょ。

★アオミドロ、表層剥離の発生が見られる場合は**モゲトン粒剤**の施用が効果的です。(特別栽培米は使用不可)

★フロアブル・ジャンボ剤の強風下での使用は、薬剤の拡散に支障をきたすことがありますので避けましょ。

令和3年度 JA庄内みどりの主な推奨除草剤一覧(移植水稻)

区分	除草剤名	10a使用量	使用時期	
体系処理剤	初期剤	エリジャン乳剤	移植直後~ノビエ1.0葉期	
		ソルネット1キロ粒剤		
	中期剤	ザーベックスDX1キロ粒剤	1kg	移植後20日~30日
		レブラス1キロ粒剤		移植後14日~ノビエ4.0葉期
		レブラスジャンボ	40g×10個	移植後15日~ノビエ4.0葉期
		テッケン1キロ粒剤	1kg	
ワイドショット1キロ粒剤				
初中期一発剤	1キロ粒剤	コメット1キロ粒剤	1kg	移植直後~ノビエ2.5葉期
		ピラクロエース1キロ粒剤		移植直後~ノビエ3.0葉期
		アップレZ1キロ粒剤		移植直後~ノビエ3.5葉期
		ボデーガードプロ1キロ粒剤		
	フロアブル	コメットフロアブル	500ml	移植後5日~ノビエ2.5葉期
		ピラクロエースフロアブル		移植直後~ノビエ2.5葉期
		アップレZフロアブル		移植後3日~ノビエ3.0葉期
		ボデーガードプロフロアブル		移植後5日~ノビエ3.5葉期
	ジャンボ	コメットジャンボ	30g×10個	移植後5日~ノビエ2.5葉期
		ピラクロエースジャンボ	50g×10個	
アップレZジャンボ		40g×10個	移植後3日~ノビエ3.0葉期	
ボデーガードプロジャンボ		30g×10個	移植後5日~ノビエ3.0葉期	
顆粒	コメット顆粒	80g	移植直後~ノビエ2.5葉期	

※ 特別栽培および直播栽培で使用できる除草剤は、限定されますのでご注意下さい！！

※ 農薬は、容器等のラベルをよく読んで使用し、農薬使用等の正確な記録の為、農作業記録野帳への記帳を忘れずに！！

※ 春は作業が集中します。農作業の安全に留意してください！！

★残り苗は田んぼに放置しない！⇒いもち病の伝染源になります。

補植苗一斉撤去デー 5月29日(土)・30日(日)

大豆は、「土づくり」と「庄内みどり大豆一発号」で多収を！！

〇〇〇 目指そう！240kg/10a 〇〇〇

今年も庄内みどり産大豆ブランド確立のため、下記栽培暦に基づいた大豆版トレーサビリティを実践します。基準を守り良質な大豆生産に努めましょう。

排水対策・土づくり等の基本技術を徹底して実施することが、高品質大豆の安定生産への最低条件です！

大豆栽培暦

(品種) リュウホウ・エンレイ・里のほほえみ

時期	作業項目	ポイント	10a 当たり資材等
4月中旬	排水対策	○圃場の周囲に明渠を実施する(深さ40cm)。 ○サブソイラーにより暗渠の排水効果を高める。	最重要対策！
5月中旬 ～ 5月下旬	土づくり 施肥 耕起	○ <u>土壌PHは、大豆に好適な6.0～6.5</u> に矯正する。 ○2回耕起とし、耕深15cm碎土率70%以上を確保する。	堆肥 1～2t 発酵鶏糞ペレット 75kg 粒状苦土石灰 120kg 大豆一発号 40～50kg 黒ひかり 40～60kg 大豆化成 684 40kg
5月中旬	種子準備	○大豆栽培初年目の圃場では根粒菌の接種が必須です。 注:根粒菌は直射日光に当てないこと。	種子 3.5～4.5kg キヒゲン 35～45g (種子量の1%) 又は キヒゲンR-2フロアブル 70～90ml (種子1kgに20ml)
5月下旬 ～ 6月上旬	播種	○5月20日～6月10日頃	条間 75cm 株間 18～22cm 2粒点播 (12,000～15,000本/10a)
5月下旬 ～ ※播種直後全面土壌散布	除草	○乳剤は、10a当り100ℓの水で希釈して散布する。 ※散布液量が不足すると除草効果が劣るので注意する。	クアターン細粒剤 F 4～5kg クアターン乳剤 600～800ml トリアノキサイド粒剤 2.5 4～6kg トリアノキサイド乳剤 250～300ml エコトップ乳剤 500～600ml ラッソー乳剤 300～400ml プロールプラス乳剤 400～600ml

◎【ネキリムシ類の防除】

- ・クルーザーFS30 種子塗沫処理 (乾燥種子1kg当たり原液6ml)
【塗沫処理順序 ①クルーザーFS30 ②キヒゲン ③根粒菌】
- ・クルーザーMAXX 種子塗沫処理 (乾燥種子1kg当たり原液8ml)
【塗沫処理順序 ①クルーザーMAXX ②根粒菌】
- ・カルホス微粒剤F 播種時に散布(6kg/10a)し、土壌混和する。

農薬の保管と空容器の処理について

◆農薬の保管は、保管庫に必ず鍵を掛けて保管しましょう。又、使用済みの農薬の空容器等は、各支店・各資材店舗で実施している農業用廃プラ回収日に処分しましょう。



《園芸情報》 アスパラガスの栽培管理について



1. 本圃準備・施肥

アスパラガスは定植すると、同じ場所で何年も栽培を続けることになるため、定植前の深耕、有機物施用による土壌改良を行うことが重要です。完熟堆肥を10a当たり10～30t 全面施用し、深耕ロータリー等を利用して30cm以上深耕するようにします。土壌pHは5.8～6.8を目標に土壌改良資材(石灰資材等)を施用します。

10a当たりの施肥量は、成分でN:15kg、P:10～18kg、K:10kg程度を目安に施用します。

2. 定植準備

畝幅は150～180cm、ベット幅は60cmを目安とし、転作田等の排水しにくい圃場では高さ15～20cmの高畝にします。土壌水分の確保や雑草対策にマルチを被覆します。マルチ内には、株元から15～20cm程度離れた位置に灌水チューブを設置します。

3. 定植

株間は40cmとし、深さ7～10cm程度に植え付け、マルチの開口部を塞ぐように覆土します。植え付けが深すぎると葉が伸長しなかったり、葉が伸びても茎が伸長しなかったりしますので注意しましょう。

4. 定植1年目の管理(茎葉管理)

定植1年目は収穫を行わず、茎葉の管理に努めます。支柱を立て、フラワーネット(4目)を張ります。ネットの位置は地際部から50cmの高さにします。倒れた茎は地際部から取り除きますが、可能な限り茎は倒さないように管理します。

灌水は、生育状況、土壌条件、時期にもよりますが、2～3日に1回を目安に行い、乾湿差がでないように管理します。

5. 定植2年目以降の管理(収穫・株養成)

定植2年目から収穫が始まりますが、若茎が30cm程に伸び、先端が開く前に地際から刈り取りましょう。若い株は株養成に重点を置き、春季の収穫期間を短くします。春季の収穫期間については、収穫芽の太さ(例えば、2L・L階級が減少し、S階級が増えてきたら終了する)、収穫芽の状況(穂先の開き、曲がりが見えたら終了する)等を観察して決定します。

春季の収穫後は夏秋季の収穫に向けて、親茎を立茎します。親茎として立茎する茎は、直径1～1.5cm程度のものを選び、株当たり4～5本を目安に立てます。目標とする親茎数を確保することができたら、除草や下枝かき、扁平や曲がり等の奇形となった若茎の除去をこまめに行います。その後は、親茎を順調に生育・維持させながら、6～9月にかけて萌芽してくる若芽を収穫していきます。

6. 防除

病害は斑点病・茎枯病・灰色かび病が発生します。基本的に銅剤等による予防防除に努めましょう。害虫はアザミウマ類・カメムシ類・ヨトウムシ類・オオタバコガが発生します。農薬や病害虫等に関する疑問・質問は各園芸センターへお問い合わせください。

★次号の発行は6月10日です！



つや姫・雪若丸情報コーナー
植込み本数は70株/坪、5本/株植えて

○疎植では、初期茎数の確保が遅れ、その後の管理に影響します。植込み本数100本/m²程度を目安とし、疎植は避けましょう。

○移植は天気の良い日に行い、その後の保温的水管理により速やかに活着させ、初期生育を促進しましょう。