

ケイトウ栽培資料（盆、秋彼岸出し）

Q どんな品種があるの？

久留米系：花穂が球形になるタイプ。代表的な品種はサカタプライド。到花日数は70～80日程度
 羽毛系：花穂が羽毛状になるタイプ。代表的な品種はセンチュリー系。到花日数は60日程度

Q 盆、彼岸に咲かせるにはいつ播けばいいの？

月 作型	4			5			6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
露地 久留米	直播			は種									収穫								
	直播			定植																	
	移植																				
センチュリー	直播			は種						収穫											
	直播																				
	移植																				

Q 肥料はどれくらいやればいいのか？

pHは5～6程度。前作がある場合、ほとんど肥料がいらない。
 やせている場合は、100坪当たりオールエイト1袋投入する。
 生育後半でカリが欠乏し下葉が枯れ上がるため、カリ肥料を使用する（ケイ酸カリ2袋）。

Q 種まきのときの注意点は？（直播）

裁植密度：条間10～12cm 8条まき 3ベッド
 は種後：嫌光性種子なので種後に覆土する。発芽までは乾かさないように注意する。

Q 種をまいてからの管理はどうするの？

間引き：発芽揃い後（直播では発芽約1ヵ月後）に間引きする。
 定植：本葉3～4枚になったら定植する。条間10～15cm 株間10cm
 水管理：かん水は発芽までは乾かないようにするが、その後は乾いたときに与える程度でよい。
 追肥：生育状況を見て早めにする。出荷時には下葉が黄変する程度がよい。
 その他：久留米系は早めにフラワーネットを張る。

Q どんな病気や虫が出るの？

病気：灰色かび病、立枯病 疫病 被害株の抜き取り、土壌消毒
 虫：アザミウマ、ネコブセンチュウ、ヨトウムシ、アブラムシ、ハダニ
 アザミウマは奇形花を引き起こす場合あり。