

**作溝・中干しを徹底し、根の活力を維持しましょう！
「スマートつや姫」で適期適量の穂肥を実施しましょう！**

1 6月30日現在の生育診断圃の生育状況

品種	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD)	スマートつや姫	
						穂肥 適期	出穂 予想
はえぬき 酒田市荻島 5/13移植	本年	54.6	616	9.4	39.8	7/5頃	7/30頃
	前年	49.2	583	9.3	39.1		
	平年	52.4	628	9.8	40.9		
	平年比	104	98	-0.4	-1.1		
つや姫 酒田市漆曽根 5/13移植	本年	58.5	456	9.4	37.7	7/7 ~12頃	8/6頃
	前年	56.4	478	9.6	38.7		
	平年	54.1	497	9.5	41.9		
	平年比	108	92	-0.1	-4.2		
雪若丸 酒田市前川 5/12移植	本年	47.8	641	9.8	40.1	7/7頃	8/1頃
	前年	49.0	644	10.6	39.9		
	平年	46.0	736	10.0	45.7		
	平年比	104	87	-0.2	-5.6		

平年：令和2年～令和6年の5カ年

生育診断圃の生育は、草丈が平年よりやや長く、葉色が平年よりやや淡い状況です。茎数は平年並から少ない状況ですが、指標穂数分の茎数は確保されています。

「スマートつや姫」適期作業カレンダーによると、「はえぬき」では7月5日頃から、「つや姫」では7月7日頃から、穂肥の適期になると予想されています。

出穂が平年より早まることも想定し、早速アクセスして、穂肥の適期や出穂時期などを確認しましょう！



「スマートつや姫」
アクセスはこちら

2 作溝・中干しを徹底し、穂肥のできる稲姿へ！

今後1か月程度は気温の高い状態が続く見込みです。

今後どのような気象が来ても対応できるよう、今の時期に確実に中干しを実施し、根の活力を維持することが重要です。

【中干し実施が遅れた圃場】

穂肥前まで中干しを継続し、適期・適量の穂肥を実施できる稲姿に仕上げましょう。

【早期に中干しを実施し、小ヒビが入っている圃場】

葉色が低下し田面が硬くなったら、中干しを終了しましょう。
走り水程度に入水し、徐々に間断かん水に移行しましょう。



生育が小さい圃場や砂質で乾きやすい土壌の場合、この程度で入水します。

3 遅れずに生育診断を行い、適期・適量の穂肥を！【穂肥の目安】

品種	本年の 予想出穂期	葉色		施肥窒素量 (N 成分 kg/10a)		
		SPAD	葉色板	出穂 30 日前	出穂 25 日前	出穂 20 日前
つや姫	8/6 頃	39 以下	4.9 未満	1.5 (有機N入り)	—	—
はえぬき	7/30 頃	35 以下	4.5 以下	1.5～2.0	—	(1.0～1.5)
		36～39.9	4.6～4.9	—	1.5～2.0	—
		40 以上	5.0 以上		1.0～1.5	
雪若丸	8/1 頃	40～44	5.0～5.4	—	1.5	—
ひとめぼれ	7/30 頃	33～37	4.3～4.7	—		1.0～1.5

遅れずに生育診断を行い、適期・適量の穂肥を実施しましょう。上記【目安】を参考に、葉色が低下している場合は、適期より早めに施用し葉色を維持しましょう。


「スマートつや姫」を活用！

地域の穂肥巡回に参加し、JA 指導員や普及指導員に相談！

4 高温時の水管理 ～間断かん水又は飽水管理で根の活力を維持～

中干し終了後は、間断かん水又は飽水管理を実施し、土壌を酸化的に維持し、根の活力を維持しましょう！

中干し終了～出穂までの水管理




「水のためっぱなし」は厳禁！

5 病虫害防除

病虫害防除所の発生予察情報では、斑点米カメムシ類の発生量は「多い」と予想されています。雑草での増殖抑制のため、畦畔・農道等の継続的な雑草対策を徹底しましょう。

スマートつや姫 「穂肥診断マップ」更新！！



①【生育診断マップ】を選択

②診断結果が圃場ごと色分されて表示

※移植が遅い、初期生育不良等の場合、実際の圃場で最終判断する。

7/7 (月)
再更新予定

酒田普及課 LINE

- 米づくり情報
- 生育調査の結果
- 適期刈取りに向けた情報
- 「スマートつや姫」の情報 など

タイムリーに情報発信中！

友だち登録は
こちらから→

