

「はえぬき」出穂早い！ 早めの刈取り準備を！

根の活力を維持する丁寧な水管理を！

早期落水は屑米の元です！

1 出穂の状況、穂揃期調査結果

管内の出穂状況は、「はえぬき」「雪若丸」等の中生品種では平年より2～3日程度早まり、「つや姫」ではおおむね平年並となりました。

管内平坦部の出穂盛期

はえぬき・雪若丸・ひとめぼれ	つや姫
7月29日～31日頃	8月7日～9日頃

生育診断圃の生育は、穂数は平年並からやや少ないですが、一穂粒数が多く、粒数は平年よりやや多くなっています。稈長は平年並からやや長く、止葉の葉色は淡い状況です。管内全体でも同様の傾向と思われますが、圃場ごとのバラつきが見られます。

生育診断圃の穂揃期の生育

※一穂粒数、総粒数は暫定値

品種	年次	出穂期 (月/日)	稈長 (cm)	穂数 (本/㎡)	一穂粒数 (粒/本)	総粒数 (百粒/㎡)	止葉葉色 (SPAD)
はえぬき 酒田市荻島 5/13移植	本年	7/30	74.5	531	72.6	386	31.1
	前年	8/2	75.5	542	63.3	343	35.7
	平年	8/1	75.9	539	66.4	358	37.2
	平年比	-2	98	99	109	108	-6.1
つや姫 酒田市漆曽根 5/13移植	本年	8/9	84.4	423	81.7	346	27.2
	前年	8/7	84.0	443	70.6	313	36.7
	平年	8/8	77.9	444	73.6	327	34.4
	平年比	+1	108	95	111	106	-7.2
雪若丸 酒田市前川 5/12移植	本年	7/30	75.9	576	65.6	378	32.4
	前年	8/3	76.2	618	54.4	336	36.1
	平年	8/2	73.9	606	60.4	365	36.8
	平年比	-3	103	95	109	104	-4.4

平年：令和2年～令和6年の5カ年

粒数は多い

2 最後まで登熟を高める丁寧な水管理を！ ～早期落水は厳禁！～

7月の気象状況は、平年に比べて、平均気温+3.9℃、降水量1.4%、日照時間167%となり、記録的な「高温少雨多照」で経過しました。8月5日以降、まとまった降雨があり1週間程度平年より気温が低くなりましたが、現在は平年より高い状況が続いています。日照時間は出穂後もおおむね平年並みを確保しています。

今後も気温は高い予報です。粒数が多い圃場では、稲体の消耗による品質低下と、早期落水による登熟不良（屑米増）・胴割粒や白未熟粒の多発が懸念されます。

【水管理のポイント】

- ①朝夕の入水や間断かん水や飽水管理を丁寧に行い、根の活力を維持しましょう。
 - ②落水は必ず出穂後 30 日以降とし、登熟を促進させましょう。
 - ③フェーン現象等の高温や台風（強風）が予想される場合は、一時的に湛水して稲体の消耗を防ぎましょう。
- ※土地改良区や地域の番水計画を遵守し、用水が全域に行き渡るようにしましょう。

3 適期刈取り ～刈り始めは総合的に判断 刈り遅れにならない計画を～

出穂後の積算気温からみた刈取り適期の目安は下表のとおりです。刈り始めの判断は、この積算気温を目安に、時期が近くなったら枝梗の黄化、青籾歩合、籾水分をチェックし、総合的に判断します。刈取り適期晩限を守れるように計画を立てましょう。

出穂後の平均気温の積算から予想される刈取り適期の目安（平坦部）


品種	出穂期	8/18 現在 積算気温	刈取り適期 積算気温の範囲	刈取り適期の目安		
				期間(月/日)	刈り始め 青籾歩合	籾水分
はえぬき	7/30 頃	518℃	900℃ ～1, 150℃※	9/2～9/11	20%	25% 以下
雪若丸					15～20%	
つや姫	8/9 頃	235℃	950℃ ～1, 150℃※	9/16～9/25	15%	

※モデル酒田市平坦部：本年値は 8 月 17 日まで 8 月 18 日～9 月 10 日は予測値（気象庁予測による平年差を用いて算出）、以降平年値を用いて積算したもの

※高温登熟年次の刈取適期は、「はえぬき」「雪若丸」は 900℃～1, 150℃、「つや姫」は 950℃～1, 150℃となる

「スマートつや姫」 適期刈取り情報

① 刈取適期マップ



9 月上旬更新！

② 適期作業カレンダー



「スマートつや姫」
アクセスはこちら

刈取適期
表示

米づくり情報

次週から、登熟調査結果をお届け！
刈取りの参考にしましょう！

酒田普及課
LINE

からも受け取れます

友だち登録はこちら→

