

高温で登熟進む！早めの刈取りを！

籾水分や登熟歩合の推移を注視し刈り始めを！

品質最優先！ 刈取り晩限を守って品質低下を防止！

1 登熟の推移

生育診断圃の 8 月 26 日現在の登熟歩合は、「はえぬき」「雪若丸」で 65%程度となり平年より+15~28%進んでいます。

籾水分は「はえぬき」「雪若丸」で既に 28%程度となっています。今年は平年より出穂が早い圃場が多く、出穂後、高温多照で経過し、暦日で見ても登熟は平年より進んでいます。




写真 籾と玄米（酒田市荻島「はえぬき」） 玄米は 1.9mm 以上




図 暦日と登熟歩合の推移（酒田市荻島「はえぬき」）

生育診断圃の登熟状況（8 月 26 日現在）

（ ）は平年差

品種	出穂期	籾水分	登熟歩合	積算気温
酒田市荻島 はえぬき	7/30 (-2日)	28%	65.9% (+14.4)	750℃ (+46)
酒田市前川 雪若丸	7/30 (-3日)	28%	65.3% (+27.6)	750℃ (+116)
酒田市漆曽根 つや姫	8/9 (+1日)	33%	0.9% (-13.3)	462℃ (-24)

2 適期刈取り

刈取り適期の目安は下表のとおりです。刈始め時期は、積算気温を目安に、圃場の籾数の多少、枝梗の黄化、青籾歩合、籾水分等から総合的に判断しましょう。

【今年の刈取りにおける注意点】

- 例年より出穂揃いまで時間がかかり、籾数が多いことから、登熟進度が圃場内でバラついていっているところも見られます。そのため、現時点では**青籾歩合の低下が緩慢となっているようにみられます**。籾水分や登熟歩合の推移を注視し、刈取り開始を見極めてください。
- 出穂後、高温で経過し、**葉色が淡いこと**から、今年は特に、**刈り遅れによる胴割粒多発**が懸念されますので、刈り遅れのないよう作業を進めましょう。


品質維持の観点から、刈取晩限までに刈取りましょう！

出穂後の平均気温の積算から予想される刈取り適期の目安（平坦部）


品種	出穂期	8/27 現在 積算気温	刈取り適期 積算気温の範囲	刈取り適期の目安		
				期間(月/日)	刈り始め 青籾歩合	籾水分
はえぬき	7/30 頃	772℃	900℃ ～1,150℃※	9/1～9/10	20%	25% 以下
雪若丸					15～20%	
つや姫	8/9 頃	490℃	950℃ ～1,150℃※	9/14～9/23	15%	

※モデル酒田市平坦部：本年値は8月26日まで 8月27日～9月17日は予測値（気象庁予測による平年差を用いて算出）、以降平年値を用いて積算したもの

※高温登熟年次の刈取適期は、「はえぬき」「雪若丸」は900℃～1,150℃、「つや姫」は950℃～1,150℃となる



青籾歩合の目安（達観）



高温登熟年 胴割粒歩合の推移
(H22、県研究成果情報) 品種：つや姫

米づくり情報 次号9月4日頃 発行予定
(9/2 登熟調査結果 **速報**)

酒田普及課 LINE

からも受け取れます
友だち登録こちら→

